

Род **Amblystegium** Bruch, Schimp. & Gumbel — **Амблистегиум**

Растения мелкие, в рыхлых дерновинках, зеленые, темно- или желто-зеленые, не блестящие. Стебель со слабым центральным пучком, простертый, рыхло облиственный, скученно или расставленно неправильно ветвящийся. Листья рыхло прилегающие до далеко отстоящих, яйцевидно-ланцетные, б. м. постепенно длинно заостренные, к слабо сердцевидному основанию полого закругленные, слабо вогнутые; край плоский, цельный или пильчатый; жилка тонкая, достигает (0.1-)0.4-0.6 длины листа, редко почти отсутствует; клетки листа коротко ромбические или неправильно прямоугольные, б. ч. 2-3:1, в углах основания листа квадратные, не образуют дифференцированной группы. Веточные листья не отличаются от стеблевых, за исключением несколько более мелких размеров. Однодомный.

Тип рода – *Amblystegium serpens* (Hedw.) Bruch, Schimp. & Gumbel Название от ἀμβλύς — тупой, στέγη — крыша, покров (греч.), по отсутствию клювика у крышечки. Род включает единственный вид (см. комментарии к родам *Hygroamblystegium* и *Pseudocampylium*).

1. **Amblystegium serpens** (Hedw.) Bruch, Schimp. & Gumbel, Bryol. Eur. 6: 53. 1853. — *Hypnum serpens* Hedw., Sp. Musc. Frond. 268. 1801. — **Амблистегиум ползучий**.

Стебель до 2 см дл. Листья 0.6-1.2×0.25-0.45 мм; жилка 20-30 μm шир.; клетки 15-30(-35)×7-10 μm. Спорофиты часто. Ножка до 1.5-2.5 см. Коробочка до 2.5 мм дл. Споры 10-16 μm.

Практически космополит, отмеченный, помимо холодных и умеренных районов обоих полушарий, также в высокогорьях Восточной Африки и Центральной и Южной Америки. На территории России встречается повсеместно. Растет на стволах деревьев (в том числе и в условиях сильного запыления и атмосферного загрязнения), на валянике, камнях, кирпичных стенах и на различного рода бетонированных и оштукатуренных поверхностях, иногда на почве.

Mu Krl Ar Ne ZFI NZ

Kn Le Ps No Vo Km Kmu Ki Ud Pe Sv

Sm Br Ka Tv Msk Tu Ya Iv Ko VI Rz Nn Ma Mo Chu Ta Ba Che

Ku Be Orl Li Vr Ro Tm Pn Ul Sa Sr Vlg Kl As Or

Krd Ady St KCh SO KB In Chn Da

Ura YG Tan SZ NI Ynw Ynh Yne VI Chw Chc Chs Chb

Uhm **YN HM** Krn Tas Ev Yol **Yyi Yko** Mg Kkn

Sve Krg Tyu **Nvs** To Om Krm Irn **Yc Yvl Yal** Khn Kks **Kam** Kom

Al Alt Ke Kha Ty Krs Irs Irb Bus Bue Chi

Am Khm Khs Evr **Prm Sah Kur**

В пределах вида часто выделяется разновидность, *A. serpens* var. *juratzkanum* (Schimp.) Rau et Herv., Cat. No. Amer. Musci 44. 1880. — *Amblystegium juratzkanum* Schimp., Syn. Musc. Eur. 693. 1860. Она отличается более крупными растениями с более сильно отстоящими, более крупными и пильчатыми листьями (тогда как типовая разновидность имеет цельнокрайные листья). Во многих случаях отнести образец к этой или типовой разновидности представляется проблематичным из-за широкой вариабельности по указанным признакам.