

### Род **Blindia** Bruch, Schimp. & Gumbel — **Блиндия**

Растения от мелких до средних размеров, в рыхлых или густых, ярко буровато-золотистых дерновинках. Стебель темно-красный, трехгранный, слабо ветвящийся. Листья прямо отстоящие, прямые или несколько односторонне согнутые, из широко ланцетного основания постепенно суженные в шиловидную туповатую верхушку, почти целиком выполненную жилкой; край цельный или слабо пильчатый; клетки пластинки толстостенные, вверху прямоугольные, при переходе к основанию короче, до квадратных, в основании удлинено прямоугольные до линейных; в углах основания квадратные, толстостенные, темно-бурые, образующие б. м. четко дифференцированную группу. Двудомный. Перихециальные листья более резко суженные в верхушку, в остальном сходные со стеблевыми. Коробочка невысоко поднята над дерновинкой на ножке, в несколько раз превышающей длину коробочки, овальная, с широким устьем; крышечка выпуклая, с тонким косым клювиком; колечко не опадающее; перистом хорошо развит, зубцы острые, бурые, весьма ломкие.

Тип рода – *Blindia acuta* (Hedw.) Bruch, Schimp. & Gumbel Род включает от 16 до 24 видов, большая часть которых распространена в Южном полушарии. Название в честь И. И. Блинды (J. J. Blind), пастора из Мюнстера, Германия.

1. **Blindia acuta** (Hedw.) Bruch, Schimp. & Gumbel, Bryol. Eur. 2: 19. 1846. — *Weissia acuta* Hedw., Sp. Musc. Frond. 71. 1801. — **Блиндия острая**.

Стебель 0.5-1(-3) см дл. Листья около 2×0.2-0.3 мм, клетки пластинки в верхушке 6-8 μm шир. Спорофиты редко. Ножка 5-7 мм. Коробочка около 1 мм дл. Споры 12-15 μm.

Вид широко распространен от Арктики до гор экваториальных районов Африки и Америки, а также встречается в Южной Африке и Австралии; весьма обычен на Кавказе и в горах Сибири. В России встречается в горных районах на Кольском полуострове и Карелии, севере Европейской части, Урале, Кавказе, по-видимому, во всех горных системах Сибири и Дальнего Востока, обычно встречается по всему горному профилю (на Кавказе до 3000, на Алтае до 2280 м над ур. м.). В районах, где преобладают кислые горные породы местами весьма част и обилен. Растет на камнях, обычно влажных, в частности по берегам ручьев и возле водопадов, а иногда и на погруженных в воду большую часть года.

**Mu** Krl Ar Ne ZFI **NZ**

Kn Le Ps No Vo **Km** Kmu Ki Ud **Pe** Sv

Sm Br Ka Tv Msk Tu Ya Iv Ko VI Rz Nn Ma Mo Chu Ta Ba Che

Ku Be Orl Li Vr Ro Tm Pn Ul Sa Sr Vlg Kl As Or

**Krd** Ady St KCh SO **KB** In Chn Da

**Ura** YG **Tan SZ** NI Ynw Ynh Yne **VI** Chw **Chc Chs Chb**

Uhm YN HM Krn Tas Ev Yol **Yyi** Yko **Mg** Kkn

Sve Krg Tyu Nvs To Om Krm Irn Yc **Yvl Yal** Khn Kks Kam Kom

Al **Alt** Ke Kha Ty Krs Irs Irb Bus Bue Chi

Am **Khm** Khs Evr Prm Sah **Kur**

Вид можно узнать в природе по ярко-золотистой окраске растений и темно-красному стеблю, а также по произрастанию преимущественно на сырых скалах.